

Test dla kandydatów na selekcjonerów -pytania 1-25

1. Prawidłowa struktura płci w populacji jelenia wynosi:

- a. 1:1 na korzyść łań
- b. równe 1:1
- c. 1:2 na korzyść byków
- d. 1:1,5 na korzyść byków

2. Okres zasadniczej laktacji u łani jelenia europejskiego trwa około:

- a. 1 miesiąc
- b. 1-2 miesięcy
- c. 3-4 miesięcy
- d. nawet 8-10 miesięcy

3. Kibice, chłysty to:

- a. młode niedojrzałe byki odpędzane od łań przez byki stadne
- b. jelenie przyglądające się walce dwu byków podczas rykowiska
- c. młode samy rogate, które w drugim roku życia kryją już kozy
- d. określenie to dotyczy muflonów

4. W Polsce jelen sika występuje:

- a. równomiernie na całym terytorium
- b. w Polsce północno-wschodniej
- c. na Śląsku w okolicach Pszczyny i koło Zalewu Wiślanego w Kadynach
- d. na terenach wschodniej Polski

5. Przydatność daniela do introdukcji wraża się :

- a. jego dużą odpornością na choroby infekcyjne i inwazyjne
- b. dziennym trybem życia
- c. możliwością hodowli zarówno w dużych kompleksach leśnych jak i kompleksach śródpolnych o powierzchni 150-300 ha
- d. rzadkim zapadaniem na motylce wątrobową

6. Wymiona samic jeleniowatych to w gwarze myśliwskiej:

- a. sutki
- b. grzęzy
- c. gręzy
- d. grady

7. Okres godowy łośia to:

- a. bekowisko
- b. rykowisko
- c. bukowisko
- d. łośiowisko

8. W Polsce roczny przyrost populacji łośa waha się w granicach:

- a. 20-30 %
- b. 10-15 %
- c. 40-50 %
- d. ponad 70 %

9. Który z gatunków zwierzyny płowej potrafi w poszukiwaniu żeru nurkować pod wodą na głębokość kilku metrów:

- a. jeleń szlachetny
- b. jeleń sika c. łoś
- d. taki gatunek zwierzyny płowej nie istnieje

10. Pęk włosów długości 8-10 cm na napletku rogacza to:

- a. fartuszek
- b. kwiat
- c. kiść
- d. pędzel

11. Zmiana sukni u sarny następuje:

- a. dwa razy w roku, wiosną i jesienią
- b. jeden raz w roku, wiosną
- c. jeden raz w roku , jesienią
- d. dwa razy w roku , wiosną i zimą

12. Który z jeleniowatych ma najwyżej wyspecjalizowany przewód pokarmowy-przystosowany do wybiórczego pobierania żeru, jedynie o dużej strawności

- a. łoś
- b. daniel
- c. jeleń
- d. sarna

13. Sarna polna jest to:

- a. jeden z pięciu podgatunków sarny występujących na kuli ziemskiej
- b. forma ekologiczna sarny europejskiej
- c. odrębny gatunek rodzaju sarna
- d. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

14. Po 6 miesiącach życia młode kozłeta sarny osiągają średnią masę tuszy:

- a. 5-6 kg
- b. 8-10 kg
- c. 15 kg
- d. 15-20 kg

15. U sarny rozróżnia się trzy podstawowe formy poroża:

- a. szpicak, szóstak, ósmak
- b. szpicak, łyżkarz, łopatach
- c. szpicak, widłak, szóstak
- d. szpicak, łyżkarz, szóstak

16. Przyjmuje się, że średnia wielkość przyrostu zrealizowanego dla sarny w naszych łowiskach, w odniesieniu do wiosennego stanu liczbowego, wynosi:

- a. 10-15 %
- b. 10-30 %
- c. 40-50 %
- d. około 60 %

17. Jakie ugrupowania tworzą sarny w okresie jesienno-zimowym:

- a. jednopłciowe kierdle
- b. różnopłciowe rudle
- c. jednopłciowe chmary
- d. różnopłciowe watahy

18. W populacji jelenia o prawidłowej strukturze płci odstrzał winien wynosić:

- a. 20-30 % byków; 50-60 % łań; 10-20 % cieląt
- b. 50 % byków; 40 % łań; 10 % cieląt
- c. 30-40 % byków; 40-50 % łań; 10-30 % cieląt
- d. 40 % byków; 50 % łań; 10 % cieląt

19. W populacji sarny o prawidłowej strukturze płci odstrzał powinien wynosić:

- a. 30 % rogacze; 50 % kozy; 20 % kozłeta
- b. 40 % rogacze; 50 % kozy; 10 % kozłeta
- c. 50 % rogacze; 40 % kozy; 10 % kozłeta
- d. 50% rogacze; 30% kozy; 20% kozłeta

20. Cielęta jelenia szlachetnego najczęściej przychodzą na świat w miesiącach:

- a. maj- czerwiec
- b. luty- marzec
- c. lipiec- sierpień
- d. wrzesień- październik

21. W populacji łosia prawidłowy stosunek płci winien wynosić:

- a. 1:1,5 na korzyść kłep
- b. 2:1 na korzyść byków
- c. równe 1:1
- d. 1:3 na korzyść kłep

22. Plamki na sukni charakterystyczne dla większości jeleniowatych nie występują u:

- a. koźlaków b. łoszaków
- c. cielaków jelenia
- d. cielaków daniela

23. Nogi u sarny to w gwarze myśliwskiej:

- a. biegi
- b. badyle
- c. cewki
- d. skoki

24. W stosunku do samców zwierzyny płowej stosuje się następujące rodzaje odstrzałów:

- a. selekcyjny, redukcyjny
- b. redukcyjny, sanitarny
- c. redukcyjny, selekcyjny, odstrzał samców łownych
- d. selekcyjny, samców łownych, sanitarny, redukcyjny

25. Liczba osobników , które spośród wszystkich urodzonych w danym roku dożyły do stanu osobników wyrośniętych (od wiosny do wiosny) to:

- a. bilans roczny populacji
- b. śmiertelność zimowa populacji
- c. przyrost zrealizowany
- d. naturalna śmiertelność

26. U jelenia podstawowym sposobem określania wieku jest:

- a. kolor i rozkład plamek na głowie
- b. ilość odnóg na każdej z tyk wieńca
- c. ogólny wygląd sylwetki, kolejność wymiany i stopień starcia zębów
- d. określenie wieku jest praktycznie niemożliwe

27. Poroże jelenia szlachetnego (wieniec) składa się z dwu tyk na których wyróżnia się odnogi. Ich nazwy (od najwyższej do najniższej) to:

- a. opierak, oczniak, nadoczniak, korona lub widlica
- b. opierak, nadoczniak, oczniak, korona lub widlica
- c. korona lub widlica, nadoczniak, opierak, oczniak
- d. oczniak, nadoczniak, opierak, korona lub widlica

28. Pasynki to:

- a. tyki w porożu rogacza
- b. wyrostki dłuższe niż 2 cm na wieńcu jelenia
- c. odnogi na łopacie w porożu łosia
- d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

29. Populacja ma poprawną strukturą wiekową jeżeli:

- a. liczebność osobników w poszczególnych kategoriach wiekowych jest podobna
- b. dominującą ilościowo osobniki w średnim wieku
- c. rozkład wiekowy tworzy tzw. piramidę, w której podstawę tworzą osobniki młode
- d. rozkład wiekowy tworzy tzw. piramidę, w której podstawę tworzą osobniki najstarsze

30. Przyrost zrealizowany w populacji sarny wynosi średnio:

- a. do 36% stanu wiosennego całości populacji
- b. około 0,6 koźlęcia od 1 kozy
- c. przeciętnie 1,5 koźlęcia od każdej kozy
- d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

31. Odstrzał koźłat płci męskiej:

- a. powinien stanowić około 10% wszystkich zaplanowanych do odstrzału osobników męskich
- b. może stanowić co najwyżej 10% zaplanowanych do odstrzału koźłat
- c. powinien stanowić więcej niż 50% zaplanowanych do odstrzału koźłat
- d. może być wykonany tylko w ramach odstrzału redukcyjnego

32. Rozłożenie odstrzałów jeleni - byków w klasach wiekowych powinno wynosić:

- a. I klasa- 30-40%; II klasa- 40-50%; III klasa- 10-20%
- b. I klasa- 50%; II klasa 40%; III klasa- 10%
- c. I klasa- 70%; II klasa 10%; III klasa- 20%
- d. Podział na klasy jest mało istotny, liczy się ogólna ilość byków zaplanowanych do odstrzału

33. Jelen myłkus to taki, który ma:

- a. rażąco niesymetryczne poroże
- b. złamane co najmniej dwie odnogi bojowe
- c. tylko jeden nadoczniak
- d. każdy byk jednostronnie koronny

34. Rogacz łowny to:

- a. każdy mocny, regularny szóstak
- b. mocny szóstak w drugiej klasie wieku
- c. mocny, regularny szóstak (lub powyżej tej formy) w co najmniej 3-ciej głowie, o porożu powyżej przeciętnej dla danego regionu
- d. nieważna forma poroża, liczy się tylko jego waga

35. Selekcyjne rogacze w I klasie wieku to między innymi:

- a. widłaki nieregularne
- b. widłaki regularne bez róż
- c. wszystkie szpicaki bez względu na wysokość i grubość poroża
- d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

36. Wśród rogaczy w II klasie wieku selekcyjnym jest każdy:

- a. posiadający poroże poniżej formy szóstaka
- b. nieregularny szóstak
- c. szóstak o rozłódze powyżej 50%
- d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

37. każdy jelen z porożem nieregularnego szóstaka jest selekcyjnym:

- a. już w I klasie wieku
- b. dopiero w II i III klasie
- c. od klasy Ib
- d. żadna odpowiedź nie jest poprawna

38. Byk z rozwidlonym oczniakiem jest z tego powodu selekcyjnym:

- a. już od I klasy wiekowej
- b. już od II klasy wiekowej
- c. dopiero w III klasie wiekowej
- d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

39. W II klasie wieku bykiem selekcyjnym jest:

- a. każdy ósmak
- b. każdy nieregularny dziesiątak
- c. każdy regularny dziesiątak
- d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

40. Trójdzielny ząb przedtrzonowy ma :

- a. byk w 1-szej głowie
- b. cielę
- c. byk do ukończenia czwartego roku życia
- d. tylko byki w III klasie wieku

41. Przyząbek nie ma rejestru u:

- a. cieląt
- b. jeleni w I klasie wieku
- c. jeleni, które nie ukończyły rozwoju kośćca
- d. jeleni w III klasie wieku

42. W klasie Ib bykami selekcyjnymi są między innymi:

- a. nieregularne ósmaki
- b. nieregularne dziesiątaki
- c. posiadające wilcze odnogi
- d. nieważna jest forma poroża tylko jego waga

43. Najczęstszą reakcją zwierzyny na strzał komorowy jest:

- a. zgarbienie się i szybka ucieczka
- b. wykonanie tzw. rakiety, lub padnięcie w ogniu
- c. wierzgnięcie zadem i wolne oddalenie się
- d. brak odruchu, zalegnięcie po krótkim dystansie

44. Najczęstszą reakcją po strzale na miękkie jest:

- a. potknięcie się i wolne oddalenie
- b. "barani skok" i zalegnięcie po krótkim dystansie
- c. drgnięcie lub brak odruch i szybka ucieczka
- d. upadek, szybkie powstanie i ucieczka

45. Po strzale zwierzę pada w ogniu, tłucze się na ziemi, po czym wstaje i uchodzi.

Jest to reakcja na strzał :

- a. w bądl lub cewkę
- b. w wątrobę
- c. na puste
- d. przez mięśnie

46. Przy strzale na miękkie średni dystans ucieczki zwierzyny wynosi:

- a. do 100 metrów
- b. 25-50 metrów
- c. w granicach kilkuset metrów
- d. kilkanaście kroków

47. Orientacyjny czas podjęcia poszukiwań po strzale na wątrobę wynosi:

- a. 2 godziny
- b. 1 godzinę
- c. 20 minut
- d. natychmiast po strzale

48. Do uściślenia miejsca na zestrzale służą:

- a. ścinka i odchody
- b. farba i tropy
- c. ścinka, tropy i kierunek ucieczki
- d. ścinka, farba i ewentualnie kawałki kości

49. Farba na tropie przy strzale na miękkie jest:

- a. ciemna, obfita, zmieszana z treścią żołądkową
- b. jasna z pęcherzykami powietrza
- c. jasna , rozwodniona, zmieszana z treścią pokarmowa
- d. ciemnoczerwona, pienista

50. Kolejność postępowania przy dojściu do odstrzelonej sztuki

- a. ocena wizualna umiejscowienia kuli i patroszenie
- b. patroszenie, odcięcie trofeum, ostatni kęs
- c. odcięcie trofeum i patroszenie
- d. rozładowanie broni, ostatni kęs, patroszenie

Test dla kandydatów na selekcjonerów -pytania 51-75

51. Jeleń ma pełne uzębienie żuchwy w wieku około:

- a. 18-20 miesięcy
- b. 24 miesięcy
- c. 28-30 miesięcy
- d. powyżej 30 miesięcy

52. Mała plamka nad chrapami jest charakterystyczna dla:

- a. młodego jelenia
- b. młodego koziołka
- c. rogacza łownego
- d. jest to wyłączna cecha danieli

53. Prawidłowa struktura płci u saren wynosi:

- a. 1:1
- b. 1,5:1 na korzyść rogaczy
- c. 1:1,5 na korzyść kóz
- d. 1:3 na korzyść kóz

54. Okres rui u sarny przypada najczęściej na miesiące:

- a. wrzesień-październik
- b. lipiec-sierpień
- c. maj-czerwiec
- d. listopad-grudzień

55. Okres godowy u daniela przypada na:

- a. maj
- b. lipiec
- c. październik
- d. grudzień

56. W gwarze myśliwskiej okres godowy u daniela to:

- a. bukowisko
- b. rykowisko
- c. bekowisko
- d. huczka

57. Łanie jelenia europejskiego osiągają maksymalną wielkość i masę ciała w:

- a. 3-4 roku życia
- b. 6-8 roku życia
- c. 10-12 roku życia
- d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

58. Przyrost zrealizowany w europejskiej populacji jelenia waha się średnio na poziomie:

- a. 40-70 cieląt na 100 łąn
- b. 10-20 cieląt na 100 łąn
- c. 70-85 cieląt na 100 łąn
- d. powyżej 100 cieląt na 100 łąn

59. Jasna plama na zadzie to:

- a. talerz
- b. zwierciadło
- c. lustro
- d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

60. U którego z gatunków jeleniowatych lustro jest czarno obżerzone:

- a. sarny
- b. jelenia
- c. łosia
- d. daniela i jelenia sika

61. Narośl skórna na podgardlu łosia, obrośniętą długim włosem nazywamy:

- a. kądzielą
- b. brodą
- c. grzywą
- d. czapą

62. U którego gatunku zwierzyny płowej zmiana sukni odbywa się u dorosłych osobników tylko jeden raz w roku:

- a. jelenia
- b. daniela
- c. łosia
- d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

63. Łoszaki przychodzą na świat w:

- a. marcu
- b. marcu i kwietniu
- c. maju
- d. czerwcu i lipcu

64. W korzystnych warunkach środowiskowych masa łoszaków po 6 miesiącach może wynosić nawet:

- a. 50-60 kg
- b. 70-80 kg
- c. 100 kg
- d. 120-130 kg

65. Poroże łosia łopatacza i badylarza to:

- a. wieniec
- b. łopaty
- c. rosochy
- d. nie zamieszczono poprawnej odpowiedzi

66. Czy w tropie sarny odciskają się szpile:

- a. tak
- b. nie
- c. tylko w tropie gonnym
- d. tak, ale tylko u sarny rogacza

67. Fartuszek jest to:

- a. pęk włosów na napletku sarny rogacza
- b. pęk włosów w okolicach sromu kozy
- c. zdrobniała nazwa zwisającej wargi gęby łosia
- d. pęk włosów na napletku łosia

68. Ile miesięcy trwa ciąża u sarny:

- a. 6
- b. 8
- c. 10
- d. 12

69. Ciąża utajona u sarny trwa przez pierwsze:

- a. 1-1,5 miesiąca
- b. 2-2,5 miesiąca
- c. 3-3,5 miesiąca
- d. 4-4,5 miesiąca

69. Areał osobniczy u sarny wynosi:

- a. do 20 ha i u sarny polnej jest mniejszy niż u sarny leśnej
- b. 20-150 ha i w środowisku leśnym jest mniejszy niż w polnym
- c. 700-1000 ha i w środowisku leśnym jest mniejszy niż w polnym
- d. powyżej 1000ha i w środowisku leśnym jest większy niż w polnym

70. Orientacyjny czas poszukiwań po strzale na miękkie wynosi;

- a. po upływie 1 godz. i bezwzględnie z posokowcem
- b. niezwłocznie i koniecznie z psem
- c. po upływie 2-3 godzin i niekoniecznie z psem
- d. po upływie ponad 5 godzin i niekoniecznie z psem

71. Strzał przez mięśnie poznajemy po:

- a. farba jasna, rozwodniona, rozsiana regularnie po obu stronach tropu
- b. farba ciemnoczerwona, rozsiana regularnie wzdłuż tropu
- c. farba jasna, obfita, rozproszona
- d. farba jasnoczerwona i pienista

72. Farba na tropie po strzale na miękkie jest:

- a. ciemna, obfita, zmieszana z treścią żołądkową
- b. jasna z pęcherzykami powietrza
- c. jasna, rozwodniona, zmieszana z treścią pokarmową
- d. ciemnoczerwona, pienista

73. Kolejność czynności przy patroszeniu samców zwierzyny płowej

- a. wycięcie odbytu, rozcięcie powłok brzusznych, odbicie łba, usunięcie jąder
- b. odbicie łba, wycięcie tchawicy z przełykiem, usunięcie jąder, rozcięcie powłok brzusznych
- c. usunięcie jąder, wypreparowanie tchawicy z przełykiem, rozcięcie powłok brzusznych
- d. rozcięcie powłok brzusznych, wycięcie odbytu, odbicie łba i wycięcie tchawicy z przełykiem