

# Test egzaminacyjny dla selekcjonera z wykazem odpowiedzi

## 1. Rola licówki najbardziej zaznaczona jest w chmarze:

- a) jeleni;
- b) danieli;
- c) saren;
- d) łosi i saren

## 2. Prawidłowa struktura płci u sarny wynosi:

- a) od 1:1,5 do 1:2,5 na korzyść kóz;
- b) od 1:1 do 1:1,5 na korzyść kóz;
- c) od 1:1,5 na korzyść kóz;
- d) od 1:1 do 1:1,1 na korzyść rogaczy.

## 3. W populacji jeleni o prawidłowej strukturze płci odstrzał powinien wynosić:

- a) byki 30-40%, łanie 40-50%, cielęta do 30%;
- b) byki 10-30%, łanie 30-50%, cielęta do 40%;
- c) byki 30-50%, łanie 10-40%, cielęta do 30%;
- d) byki 40%, łanie 50-60%, cielęta do 10%.

## 4. Kibice lub chłysty to:

- a) młode niedojrzałe byki odpędzane od łań przez byka stadnego;
- b) jelenie przyglądające się walce dwóch byków w czasie rykowiska;
- c) młode sarny rogacze, które w drugim roku życia kryją już kozy;
- d) określenie to dotyczy muflonów.

## 5. Badylarz jest to:

- a) jeleni byk nie wykształcający koron;
- b) łos byk, który nie wykształcił łopat;
- c) samiec zwierzyny płowej, który w drugim roku życia nie wykształcił poroża;
- d) określenie dotyczy sarny rogacza w wyjątkowych przypadkach.

## 6. Prawidłowy odstrzał jelenia byka szpicaka to:

- a) szpicak o długości tyk do 10 cm;
- b) szpicak o długości tyk do 15 cm ;
- c) szpicak o długości tyk do 20 cm;
- d) szpicak o długości tyk do 30 cm.

## 7. Co to jest pojemność łowiska:

- a) ilość zinwentaryzowanej zwierzyny na dzień 31.03;
- b) ilość zwierzyny przypadającej na 1000 ha powierzchni lasu;
- c) umowna liczba zwierzyny jaką może się wyżywić na jednostce terenu bez wyrządzania szkód w lesie i polu;
- d) umowna liczba saren jaka może się wyżywić na 1000 ha powierzchni lasu.

## 8. U jelenia szlachetnego podstawowym sposobem określania wieku po odstrzale jest:

- a) kolor i rozkład plamek na głowie;
- b) ilość odnóg na każdej z tyk wieńca;
- c) kolejność wymiany i stopień starcia zębów;
- d) określenie wieku jest praktycznie niemożliwe.

**9. Do zwierzyny poruszającej się po wierzchołku wzniesienia, w terenie otwartym, wolno strzelać myśliwemu gdy odległość myśliwego od celu wynosi:**

- a) 30 m śrutem i 50 m kulą z broni o lufach gładkich;
- b) 35 m i tylko śrutem;
- c) maksymalnie dopuszczalną regulaminem dla strzału śrutowego;
- d) nie wolno strzelać wcale.

**10. W jakim okresie po pozyskaniu można dokonać wyceny ostatecznej trofeum:**

- a) po jednym miesiącu;
- b) po trzech miesiącach;
- c) po sześciu miesiącach;
- d) po dziesięciu miesiącach.

**11. Które z wymienionych trofeów łowieckich podlega wycenie wstępnej:**

- a) czaszka lisa, poroże jelenia szlachetnego, poroża jelenia sika, oręż dzika;
- b) poroże jelenia szlachetnego, jelenia sika, daniela; ślimy muflona;
- c) poroże łosia, jelenia szlachetnego, jelenia sika, daniela, sarny;
- d) poroża łosia, jelenia szlachetnego, ślimy muflona, czaszka borsuka.

**12. Przy której z podanych mas poroża brutto trofeum jelenia szlachetnego podlega wycenie wstępnej :**

- a) co najmniej 5 kg;
- b) co najmniej 5,5 kg;
- c) co najmniej 6 kg;
- d) co najmniej 6,5 kg.

**13. Poroże jelenia szlachetnego (wieniec) składa się z dwóch tyk na których wyróżnia się odnogi – ich nazwy (w kolejności od najniższej do najwyższej) to:**

- a) opierak, oczniak, nadoczniak, korona (widlica grot);
- b) opierak, nadoczniak, oczniak, korona (widlica lub gro);
- c) korona, widlica lub grot, nadoczniak, opierak, oczniak;
- d) oczniak, nadoczniak, opierak, korona (widlica lub grot).

**14. Gatunkiem zwierzyny o najmniejszym zagęszczeniu w przeliczeniu na 1000 ha jest:**

- a) sarna;
- b) daniel;
- c) jeleni;
- d) łoś.

**15. Na tylnej krawędzi łopaty daniela byka są odnogi zwane w gwarze łowieckiej:**

- a) pasnykami;
- b) sękami;
- c) gałęziami;
- d) kolcami.

**16. W jakim wieku sarna ma już pełne uzębienie stałe:**

- a) 8-10 m-cy;
- b) 13-14 m-cy;
- c) 22-24 m-cy;
- d) 30-32.

**17. Czy wolno strzelać kulą w miot do zwierzyny?**

- a) tak, ale tylko do zwierzyny płowej i na odległość do 40 m;
- b) tak, ale z wyłączeniem zwierzyny płowej i na odległość do 40 m;
- c) do każdej zwierzyny, ale na odległość nie dalszą niż 30 m;
- d) do każdej zwierzyny, która jest w polu widzenia.

**18. Prawidłowo rozwijający się, w pełni dojrzały byk daniel, powinien być :**

- a) badylarzem;
- b) ósmakiem ;
- c) łopataczem;
- d) łyżkarzem.

**19. Dla sarny rozróżnia się trzy podstawowe formy poroża :**

- a) szpicak, szóstak, ósmak;
- b) szpicak, łyżkarz, łopatacz;
- c) szpicak, widłak, szóstak;
- d) szpicak, łyżkarz, szóstak.

**20. Rozłogę wieńca mierzymy :**

- a) w miejscu największej wewnętrznej rozpiętości między tykami pod koronami;
- b) w miejscu największej wewnętrznej rozpiętości wieńca między tykami;
- c) w miejscu największej wewnętrznej rozpiętości tyk, pomiędzy oczniakiem a opieraniem;
- d) w miejscu największej wewnętrznej rozpiętości tyk, pomiędzy nadoczniakiem a opieraniem.

**21. Które z trofeów wymaga przy wycenie medalowej pomiaru objętości w basenie:**

- a) wieniec jelenia;
- b) parostki rogacza;
- c) łopaty daniela;
- d) rosochy łosia.

**22. W ustabilizowanej populacji jelenia, pozyskanie byków powinno wynosić:**

- a) w I kl. wieku do 30%, w drugiej kl. wieku 50-60%, w m kl. wieku 20%;
- b) w I kl. wieku do 40%, w drugiej kl. wieku do 40%, w ID kl. wieku do 30% ;
- c) w I kl. wieku 30-50%, w drugiej kl. wieku 30-50%, w m kl. wieku do 20%;
- d) w I kl. wieku do 20%, w drugiej kl. wieku 50-60%, w m kl. wieku do 30%.

**23. Jakie orientacyjne wskaźniki zagęszczenia jelenia ,musimy brać pod uwagę planując pozyskanie:**

- a) 10-15 sztuk na 1000 ha lasu;
- b) 15-20 sztuk na 1000 ha lasu;
- c) 15-35 sztuk na 1000 ha lasu;
- d) 25-40 sztuk na 1000 ha lasu.

**24. Wabiąc sarnę rogacza w okresie rui naśladujemy:**

- a) szczekanie rogacza;
- b) szczekanie kozy;
- c) pisk kozy (podobny głos wydaje również kozłę) używając wabika tzw. mikotu ;
- d) kniazienie kozy.

**25. Perukarz to:**

- a) to jeleń byk po zrzuceniu wieńca;
- b) to daniel, który nie wykształcił łopat (w I kl. wieku);
- c) to kozioł lub rzadziej jeleń byk, który nie zrzuca poroża ze względu na mechaniczne uszkodzenie jąder;
- d) to łoś byk po zrzuceniu poroża.

**26. Medal brązowy u sarny rogacza przysługuje od :**

- a) 100 pkt;
- b) 105 pkt;
- c) 110 pkt;
- d) 115 pkt.

**27. Za jelenia byka łownego uznaje się byka w III klasie wieku :**

- a) w 9 roku życia o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego) o masie wieńca powyżej 3 kg;
- b) w 10 roku życia o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego) o masie wieńca powyżej 3,5 kg;
- c) w 11 roku życia i starszego o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego) o masie wieńca powyżej 5 kg;
- d) w 11 roku życia i starszego o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego) o masie wieńca powyżej 4,5 kg.

**28. Wyróżnia się klasy wiekowe sarny rogacza, I klasa wieku to:**

- a) pierwsze poroże (2 rok życia);
- b) pierwsze i drugie poroże (2-3 rok życia);
- c) od pierwszego do trzeciego poroża (2-4 rok życia);
- d) od pierwszego do czwartego poroża (2-5 rok życia).

**29. Medal srebrny u daniela byka przysługuje od :**

- a) 165 pkt.;
- b) 170 pkt.;
- c) 175 pkt.;
- d) 180 pkt.

**30. W ustabilizowanej populacji sarny, przyrost zrealizowany zawiera się w granicach:**

- a) 10-30% wiosennego stanu liczebnego populacji;
- b) 60-70% wiosennego stanu liczebnego populacji;
- c) 80-90% wiosennego stanu kóz;
- d) 30-40% wiosennego stanu liczebnego populacji.

**31. Dokonując wyceny medalowej, długość parostków mierzymy w:**

- a) centymetrach;
- b) milimetrach;
- c) długości parostków nie mierzymy tylko ważymy i dokonujemy pomiaru objętości w basenie z wodą;
- d) nie mierzymy długości parostków tylko obwód tyki prawej i lewej.

**32. Medal srebrny u jelenia byka szlachetnego przysługuje od:**

- a) 180 pkt.;
- b) 185 pkt. ;
- c) 190 pkt.;
- d) 195 pkt

**33. Prawidłowy odstrzał jelenia byka w I klasie wieku, drugie poroże (3 rok życia) to:**

- a) szóstak regularny;
- b) ósmak regularny i poniżej tej formy;
- c) ósmak nieregularny i poniżej tej formy;
- d) dziesiątek jednostronnie koronny,

**34. Zarząd okręgowy za uzyskanie 2 punktów czerwonych (XX) zawiesza w prawach odstrzału samców danego gatunku na okres :**

- a) do jednego sezonu łowieckiego;
- b) od 1 do 2 lat;
- c) od 1 do 3 sezonów łowieckich;
- d) od 1 do 4 lat.

**35. Prawidłowa struktura płci w populacji jelenia szlachetnego wynosi:**

- a) od 1:1 do 1:1,5 na korzyść łań;
- b) 1 :2 na korzyść łań;
- c) 1:1, 2 na korzyść byków;
- d) od 1:1 do 1:1,5 na korzyść byków.

**36. Za daniela byka łownego uznaje się:**

- a) łopatacza w 7 roku życia i starszego;
- b) regularnego łopatacza w 8 roku życia i starszego o prawidłowo ukształtowanych łopatach;
- c) regularnego łopatacza w 6 roku życia i starszego o prawidłowo ukształtowanych łopatach;
- d) łopatacza w 10 roku życia i starszego.

**37. Czy broń nie załadowana to broń w której :**

- a) nie ma nabojów w komorze naboju;
- b) są naboje w komorze naboju, ale broń jest zabezpieczona;
- c) nie ma nabojów w komorze naboju ani w magazynku;
- d) zamek jest otwarty, a naboje są w magazynku.

**38. Pierwsza klasa wieku u jeleni byków to:**

- a) 1-2 poroże (2-3 rok życia);
- b) 1-3 poroże (2-4 rok życia);
- c) 1-4 poroże (2-5 rok życia);
- d) 1-5 poroże (2-6 rok życia).

**39. Czy myśliwy może strzelać do zwierzyny z pojazdu mechanicznego:**

- a) tak, z każdego pojazdu;
- b) tak, ale tylko z samochodu terenowego;
- c) tak, z każdego pojazdu z wyjątkiem maszyn rolniczych (traktor, kombajn);
- d) nie.

**40. Prawidłowy odstrzał sarny rogacza w pierwszym porożu (I kL wieku) to:**

- a) guzikarze, myłkusy i szpicaki do 10 cm;
- b) guzikarze, myłkusy i szpicaki do 15 cm;
- c) guzikarze, myłkusy , szpicaki i widłaki do 10 cm;
- d) guzikarze, myłkusy oraz szpicaki i widłaki o długości parostków do ok. 8 cm.

**41. Prawidłowy odstrzał sarny rogacza w II klasie wieku (3 poroże i starsze):**

- a) wszystkie formy poniżej regularnego szóstaka;
- b) regularne szóstaki;
- c) nieregularne szóstaki o masie parostków poniżej 200 g oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny;
- d) nieregularne szóstaki i poniżej tej formy, oraz regularne szóstaki o masie parostków poniżej 350 g oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny.

**42. Polowanie na jelenie byki może odbywać się przy użyciu myśliwskiej broni palnej 0 lufach gwintowanych oraz stosowanych do niej naboju myśliwskich, które w odległości 100 m od lufy posiadają energię nie mniejszą niż :**

- a) 2500 J;
- b) 2000 J;
- c) 1000 J;
- d) 500 J.

**43. Które z podanych niżej metod inwentaryzacji służą do ustalenia liczebności 1 struktury płci oraz wieku jeleniowatych:**

- a) taksacja pasowa, całoroczna obserwacja, liczenie tropów po ponowie;
- b) pędzenia próbne, liczenie tropów w czasie zalegania śniegu, całoroczne obserwacje;
- c) pędzenia próbne, taksacja pasowa, liczenie odzywających się na wiosnę samców;
- d) taksacja pasowa, liczenie odzywających się na wiosnę samców, liczenie tropów po ponowie.

**44. Czy podczas polowania można strzelać do iani licówki:**

- a) do łam" licówki nie strzela się;
- b) można strzelać gdy nie prowadzi cielaka;
- c) można strzelać gdy pozostała część chmary porusza się w odległości większej niż 20 m.;
- d) można strzelać gdy w pobliżu nie ma byka stadnego.

**45. Za rogacza łownego uznaje się:**

- a) regularnego szóstaka w II klasie wieku;
- b) regularnego szóstaka w II klasie wieku od szóstego roku życia;
- c) regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku od szóstego roku życia wzwyż, o masie trofeum ponad 300g i wszystkich odnogach powyżej 3 cm.;
- d) regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku od szóstego roku życia wzwyż, o masie trofeum ponad 350g;

**46. Prawidłowy odstrzał sarny rogacza w drugim porożu (I klasa wieku) to:**

- a) guzikarze, szpicaki i myłkusy;
- b) nieregularne widłaki i poniżej tej formy;
- c) widłaki i poniżej tej formy;
- d) szóstaki nieregularne i poniżej tej formy.

**47. Od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania nie wolno strzelać do zwierzyny i drapieżników w odległości mniejszej niż :**

- a) 100 m
- b) 200 m
- c) 500 m
- d) 1500 m

**48. Przy której z podanych mas poroża daniela brutto trofeum podlega wycenie wstępnej:**

- a) co najmniej 2,4 kg;
- b) co najmniej 2,6 kg;
- c) co najmniej 2,8 kg;
- d) co najmniej 3,0 kg.

**49. Prawidłowa struktura pozyskania daniela w ustabilizowanej populacji wynosi**

- a) byki 20-30 %, łanie 40-60 %, cielęta do 10-40 % ;
- b) byki 30-40 %, łanie do 50 %, cielęta 10-20 %;
- c) byki do 30 %, łanie do 60 %, cielęta 10-20 %;
- d) byki 10-20 %, łanie 40-70 %, cielęta do 30 %.

**50. Medal srebrny u sarny rogacza przysługuje od :**

- a) 100 pkt.
- b) 105 pkt.
- c) 110 pkt.
- d) 115 pkt.

Nr pytania	A	B	C	D
1	X			
2	X			
3	X			
4	X			
5		X		
6			X	
7			X	
8			X	
9				X
10		X		
11			X	
12		X		
13				X
14				X
15		X		
16		X		
17		X		
18			X	
19			X	
20	X			
21		X		
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26		X		
27			X	
28		X		
29		X		
30	X			
31	X			
32			X	
33			X	
34		X		
35	X			
36		X		
37			X	
38			X	
39				X
40	X			
41				X
42		X		
43				
44	X			
45				X
46				X
47			X	
48		X		
49		X		
50				X